



«Пиро-Стоп»

Лечение и профилактика кровепаразитарных болезней

Показания к применению: назначают собакам с лечебной и профилактической целью при кровепаразитарных болезнях – пироплазмозе, бабезиозе, нуталлиозе, анаплазмозе и смешанных инвазиях.

Признаки пироплазмоза: инкубационный период – 7-10 дней после укуса собаки клещом.

Острая форма характеризуется резким повышением температуры тела до 40°, которая держится 2-3 суток и быстро спадает до нормы. У собаки пропадает аппетит, наступает угнетение, дыхание учащенное, иногда со стонами. Слизистые оболочки рта и конъюнктивы анемичны (белого цвета) или желтушные. Походка затруднена, наблюдается парез задних лап. Моча красного или кофейного цвета.

Хроническая форма характеризуется анемией, мышечной слабостью. Периоды угнетения сменяются улучшениями. Могут быть поносы ярко-желтого цвета. Цвет мочи остается без изменений. Болезнь продолжается 3-6 недель и чаще всего заканчивается выздоровлением.

Способ применения Пиро-Стоп

Препарат вводят при первых признаках пироплазмоза подкожно (в холку) или внутримышечно (в заднюю лапу) в следующих дозах:

- С **лечебной** целью 0,5 мл на 10 кг веса собаки однократно

При сохранении повышенной температуры препарат вводят повторно через 24 часа.

- С **профилактической** целью 0,25 мл на 10 кг веса собаки

Перед применением Пиростопа рекомендуется дать собаке антигистаминный препарат «Тавегил» (на 10 кг веса собаки – 0,5 таблетки).

В связи с возможной болевой реакцией на введение препарата – не следует вводить в одно место более 2,5 мл.