

Ежедневная термометрия.

Избегать прикосновений к лицу (глаза, нос, рот). Ежедневное мытье рук. Отдельная комната в квартире. Изоляция от остальных членов семьи. Проветривание помещения. Дезинфекция поверхностей бытовыми моющими средствами.

Изоляция на карантин. Выписка при наличии однократного отрицательного результата ПЦР- на наличие РНК SARS-CoV-2.

СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ:

\*Обильное питье.\_\_\_\_

\*Промывать нос солевым раствором (мореназал, физиомер, аква-риносоль, аквамарис , аквалор) 5-6 р/день 5-7 дней\_\_\_\_

\*Капли, спрей в нос ксилометазолин по 1 кап(впрыски) в каждый носовой ход при заложенности носа и н/ночь до 5-7 дней\_\_\_\_

\*Полоскать горло растворами антисептиков :Фурацилин, Мирамистин 5-6 р/день 5 дней-\_\_\_\_

\* При выраженной боли в горле Граммицидин с анестетиком (Граммидин Нео с анестетиком; Септолете тотал;Фарингосент ;Стрепсилс ;Ларипронт и пр.) рассасывать после еды 1т +1т через 30 минут 4 р/день и затем не есть, не пить в течение часа. Максимально до 7 дней\_\_\_\_

\* При наличии сухого кашля: Ацетилцистеин (АЦЦ лонг ; флюимуцил; Эспа-Нац ) водорастворимые таблетки/саше 600мг растворяют в 1 стакане горячей воды в стеклянной посуде , принимают внутрь после еды x 2 раза в сутки - 6 дней / или карбоцистеин в капсулах или сиропе (Флуифорт, Бронхобосс,Флюдитец, Мукодин, Мукосол, Бронкатар) по 2 капсулы 3 раза в сутки. При достижении терапевтического эффекта дозу снижают до 1 капсулы 4 раза в сутки. При использовании сиропа начальная доза составляет по 15 мл 3 раза в сутки; затем дозу снижают до 10 мл 3 раза в сутки\_\_\_\_

\*При повышении температуры выше 38 гр.°С парацетамол 500 мг 2 табл + 1 таб. Но-Шпы одновременно. (!парацетамол не более 4 г в сутки! )\_\_\_\_

\*При диарее: смектит дюоктазидический (Смекта; Неосмектин) содержимое 1 пакетика растворить в стакане воды x 3 раза в день между приемами пищи - 4-5 дней\_\_\_\_

\* Витамин С водорастворимые таблетки 1000мг по 1 таб/сутки развести в 1 стакане воды утром - 6 дней\_\_\_\_

\* Витамин Д 4000 МЕ/сут - длительно\_\_\_\_

\*Таб. Цинка ацетат 50 мг 1 р/д - 14 дней.\_\_\_\_\_

\*Кардиомагнил 75 мг по 1 таб после ужина -14 дней

*Просто*

ЛЕГКОЕ ТЕЧЕНИЕ :

\* фавипиروفир (коронавир) 1600мгx2 раза в день в первый день и далее по 600мгX2 раза в день со 2-го по 10 день ( при весе менее 75 кг )

фавипиروفир (коронавир) 1800мгx2 раза в день в первый день и далее по 800мгX2 раза в день со 2-го по 10 день ( при весе более 75 кг ) ИЛИ

умифеновир (арбидол) 200 мг 4 раза /сут в течение 5-7 дней\_\_\_\_

\*интерферон-а, интраназальные формы капли(спрей) (Гриппферон, Генферон Лайт) по 3000 МЕ в каждый носовой ход x 5 раз в день -5 дней

Средней степени тяжести ( КТ1)

+

\* таб. ривароксабан (ксарелто)10 мг по 1 таб X 1 раз в день внутрь, во время еды 30 дней или

таб апиксабан (эликеис) 2,5 мг по 1 таб x 2 раза в день внутрь, независимо от приема пищи 30 дней ( противопоказаны при приеме антикоагулянтов, Явление анатомоза )

\*азитромицин 500 мг в первый день 2 таб x 1 раз/сут , затем по 1 таб x 1 раз в день независимо от приема пищи 4 дня ИЛИ

таб левофлоксацин 500 мг по 1таб x 2 раза в день принимать перед едой или между приемами пищи - 5 дней.

\*Кап.Линекс Форте по 1к\*1 раза в день- 5дней

ПРИ УХУДШЕНИИ САМОЧУВСТВИЯ ВЫЗОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ!